

嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952)

Volume 1
Issue 2 第一卷第二期

Article 2

January 1930

蒲桃及屈頭雞

Yaonian SHAO

Follow this and additional works at: https://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929



Part of the [Chinese Studies Commons](#)

Recommended Citation

邵堯年(1930)。蒲桃及屈頭雞。《嶺南學報》，1(2)，21-29。檢自：http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol1/iss2/2

This Article is brought to you for free and open access by the Scholarly Publications of Lingnan University (Guangzhou) at Digital Commons @ Lingnan University. It has been accepted for inclusion in 嶺南學報 Lingnan Journal (1929-1952) by an authorized editor of Digital Commons @ Lingnan University.


蒲桃及屈頭鷄

邵堯年

(一) 蒲桃及其近緣植物

蒲桃為熱帶及亞熱帶果樹。我國南部廣東廣西福建雲南等處，常有產生。就中廣東栽培尤盛，品質亦較佳。廣東人概呼為蒲桃。福建人以其成熟時果肉與種子不相連屬，搖之則戛戛作聲，特呼為風鼓。永春縣人又以其芳香，呼為香果云。

蒲桃在植物學上屬桃金娘科 (Myrtaceae) 學名為 *Eugenia jambos*, L. 常綠喬木，高達三四丈。葉作披針形，先端尖，全邊，對生，二三月間，開白綠色花。雄蕊甚多，作毛刷狀，子房下位。花後結圓球形果，六七月成熟。徑達寸許，為黃白色，稍像枇杷果，而光滑無毛茸。果內藏種子一二枚，種子為多胚性 (Polyembionic)。每一枚種子，能發芽二株至七八株，可以隨意分植。



蒲桃之萌芽狀況



蒲桃之果实

蒲桃有二品種：

(一)無核蒲桃，俗呼蒲桃公，果形較小而長橢圓，中空無核，肉厚汁多，味甜且脆，為蒲桃之上品。

(二)普通蒲桃，俗呼蒲桃奶，又作蒲桃𧄸。果形大而短圓，子實大，肉較薄，汁亦小，香氣及食味稍劣。

子種不耐貯藏，收採後即須播種，播種後二三十日便萌芽，生長迅速：滿一年生苗高二三尺，二年生苗達六七尺，約六七年便開花結果。惟無核蒲桃需用接枝法蕃殖，一二年便開花結果。其砧木用實生蒲桃或水滸，均能存活，與蓮霧能互相嫁接。

蒲桃果形黃白色，向陽處有紅色斑點。鮮食芳香甜脆，食味頗佳。用以浸酒，名蒲桃春，經歲而芳香不減，作果膏尤美。(1)果殼可入藥，治呃忒如神(2)

蒲桃適種於溫暖肥沃濕潤之地。生長強健，虫病均少。根幹強固，不易被風吹倒。且周年常綠，枝葉婆娑，生態瀟灑，可作庭園賞玩，路旁蔭庇，及保安樹林之用。

壽命頗長，可達一二百年。幹皮光滑，木質堅固，紋理頗幼，作灰黃色。幹材比重·六六至·七二。生材甚重，比重達一·八五。

與蒲桃同科植物之見於廣東，就現時所已知者，計有八屬：

(一)番石榴屬 (*Psidium*) 計有三種：其最著者，如番石榴，學名為 *P. Gujava*, L.。栽種於園圃，或自生於山野。高一二丈，葉橢圓形，有芳香。為廣東佳果之一。

(二)子揀樹屬 (*Decaspermum*) 計有二種。如：*D. Fruticosum*,

(1) 見羅浮山志。原文作薑酒。

(2) 見本草拾遺。

Forst. 卽子棟樹，及 *D. Paniculatum*, kurz.

(三) 桃金娘屬 (*Rhodomyrtus*): 桃金娘俗呼山拈，岡拈，或水倒拈。拈亦作稔。學名爲 *R. Tomentosa* (Ait) Hassk. 自生於山野，高二三尺；花紫紅色，果紫黑色，味甜可鮮食。

(四) 岡松屬 (*Baeckea*): 岡松又呼香松及石辣，灌木高二三尺。自生於山野。有香氣可製香油。枝葉強韌，可作掃帚故又呼掃把樹。學名爲 *B. Frutescens*, L.

(五) 桉樹卽有加利樹屬 (*Eucalyptus*) 種類甚多，生態各別。就本校先後從外國輸入者達四十餘種。

(六) 千層皮屬 (*Callistemon*) 本校從外國輸入者有數種。就中以紅花千層及白花千層爲生長最佳。

(七) *Melaleuca* 卽加耶布的屬。

(八) 蒲桃屬或作丁香屬。

蒲桃屬植物之見於廣東，就已知者有二十種：

(1) 子棟樹又名毒狗藥，產於海南內部。常綠喬木，高二三丈。學名爲 *E. Cunini*, (L) Druce.

(2) *E. Bullockii*, Hance. 生於高州山野之灌木。高十餘尺，葉廣潤，對生，葉柄甚短。

(3) 長葉紫椴樹，自生於琼州五指山之灌木。高七八尺，葉爲狹長披針形，花白色。學名爲 *E. Fluriatilis*, Hems L.

(4) 灶地骨。生於山野之灌木。高五尺許，葉細小，長橢圓形，先端稍尖，葉柄短。五月時，開白色花，結小果如豆大。學名爲 *E. Henryi*, Hance.

(5) 生於海南亦作茂地方之喬木。高五六丈，徑達尺餘，葉披針

形兩端尖。五月時，開白色花，雄蕊淺紅。學名 *E. Hainanensis*, Merr. Sp. nov. in Philip. Journ. Sci. 23:255.1923。(3)

(6)紫荳樹。生於海南大園之山野。高五六尺；花白色，有芳香，葉橢圓。學名為 *E. Maclurei*, Merr sp. nov. in. Philip Jour. sci. 21: 350 1922。(4)

(7)細葉紫荳樹，自生於山野之灌木。高六七尺。葉為倒卵形，頗細；花淺紅色，有芳香。學名為 *E. Microphylla*, Abel.

(8)黃熟香，又稱子林木(汕頭)密樹榕(河南島)紫荳樹(惠州及清遠)。高一二丈。自生於山野。樹形美觀，木材堅實；葉橢圓兩端尖。學名為 *E. Millottiana*, Hems L.

(9)自生於西江江口之灌木。高三尺許。葉多小點；果如紐大；紫黑色。學名為 *E. Multibunctata*, Merr.

(10)水蛇樹(番禺)紫荳樹(汕頭)自生於廣州欽州瓊州潮汕等處山野之喬木。高二丈許。木材堅實；適作傢私之用。果實黃色。樹皮供染料用，有令布類吸收染料之功效云。學名為 *E. Minutiflora*, Hance.

(11)水榕，又呼水榕。樹高三四丈，常綠喬木。葉似蒲桃而更長大。枝梢上每有果實脫落時，所遺留痕跡，得以辨別。生長甚速而耐水濕。木材以作傢私。樹木以防風防水。果實花蕾，均以入藥。學名為 *E. Operculata*, Roxb.

(12)柳葉紫荳樹，自生於瓊州山野之灌木。高十餘尺。葉狹長，兩端尖；花白色；果實紫赤色。學名為 *E. myrsiniifolia*, Hance.

(13)自生於瓊州五指山之灌木。高六七尺；葉橢圓，兩端尖，頗

(3) 此種為本校植物學教授莫古黎先生(F. A. maclure)所發見，特以原產地海南命名
(4) 此植物亦為本校莫古黎先生(F. A. maclure)所發見，故遂以其名命名。

似陰香樹葉。學名爲 *E. saligna* (Mig) C. B. Robinson.

(14) 蓮霧又呼洋蒲桃，一名阿釐霧，爲果樹之一種。常栽種於園圃。葉似蒲桃而較廣大；葉柄甚短。果爲截圓錐形，銀白色，向陽處有臙脂色斑點。形頗美觀而風味不及蒲桃。學名待考。但台灣植物目錄，作 *E. Javanica*, Lamk。

(15) 大葉紫荳樹，自生於瀾頭之山野。學名爲 *E. Meliaefolia*, Benth。

(16) *E. Tephrodes*, Hance，爲香雅各先生之父 B. C. Henry 在瓊州採得標本。

(17) *E. Ardisiaefolia*, Merr. N. Sp. 自生於瓊州山野之灌木。

(18) *E. Aromatica* 卽丁香，有利作物之一種，爲芳香調味藥。廣東栽培尙少。南部如瓊崖欽廉等處間有之。

(19) *E. Caryophyllata* (*Caryophyllus aromaticus*, Lour.) 本土未有名稱，但 Loureir 先生曾擬名山丁香。


(20) 蒲桃，瓊州之水蒲桃亦蒲桃之類。學名待考。


(二) 屈頭鷄及其近緣植物

屈頭鷄爲自生於兩廣山野之蔓生灌木。蔓長一二丈，葉互生爲長橢圓形，葉端尖，全邊，而有波狀縐縮，復具有托葉變形之刺二枚。三月左右，從梢頭抽花梗，開黃白色花。花後結圓球形紫褐色果實，徑達寸許，內藏種子一二枚，可作果食，及供醫藥之用。初食時稍苦，繼則甚甜。

屈頭鷄在植物學上屬白花菜科 (Capparidaceae)，其學名爲 *Capparis Membranacea*, Gardn and Champ。

種子胚部旋捲，在春暖播種，經二三十天，則種皮爆裂，胚軸膨大伸張，下部生根。其形態與脊椎動物發生初期稍爲類似。粵人錫以屈頭鷄之名，料卽指此。再經十餘天，在頂端逐漸發葉；滿一年，生蔓長二尺；二年，生蔓長五六尺；六七年開花結果甚多。生長強健，不擇坭土，適於園圃上作圍籬之用。但喜熱惡寒，冬期落葉。





(5)

屈頭雞之生長順序

(1, 2, 3, 4 圖比實物約 $\frac{2}{3}$ 大，第 5 圖比實物約 $\frac{1}{3}$ 大。)

(一)種子

(二)胚軸膨大

(三)萌芽發葉

(四)萌芽後生長狀況

(五)長成後之莖葉及果實

與屈頭離同科植物之見於廣東，就現時所知者，有四屬。如：

(一)紫龍鬚：栽種於庭園之一年生草。作掌狀複葉，莖高三四尺。八九月時，開紫紅色美花。學名爲 *Gynandropsis Speciosa*, (H. B. K.) De.

(二)白花菜：自生於山野之一年生草。花細小，莖葉亦矮小。學名爲 *Pedicularia viscida*, 又作 *Polanisia icosandra* (L.) W. and A 而白花菜之一種，其學名爲 *Gynandropsis gynandra*, (L.) Merr. 又作 *Pedicularia pentaphylla*. schrank, 或 *Cleome gynandra*, L.

(三)魚木：又稱假沙梨 (番禺)虎王 (海南)朦朦 (海南)：樹高三四丈，落葉喬木，三出複葉。五月及十月時，開二回淺黃色美花。爲廣東土產賞花喬木之一。其學名爲 *Crataeva Religiosa*, Forst 瓊洲那大復有一種喬木。學名爲 *C. Lophosperma*, kur 極像魚木。

(四)屈頭雞屬：屈頭雞屬植物見於廣東，就現時已知者，亦有數種。如牛眼睛，自生於瓊洲之灌木。高四五尺。葉尖長互生，有短刺，花黃白色，堪供玩賞。其學名爲 *Capparis hastigera*, Hance. 及自生於瓊洲嘉積之 *C. Mirantha*, De, 與 *C. Hainanensis*, Oliv. 自生於番禺之假橙爲常綠灌木。葉長橢圓，兩端尖，有小刺。十月時開小白花。其學名爲 *C. Pumila*, champ. 土人以供藥用，又有自生於廉州之 *C. Sepiaria*, L, 自生於海南之 *C. Acuminata*, Willd 與 *C. Flexicaulis*, Hance 及自生於欽州山野之酒醉果。

以上列舉植物名稱產地性狀，除由作者調查所得外，並取材於本校植物標本室，及得高魯甫先生 (G. W. Goff) 所幫助者甚多。附錄於此，並誌感謝。